

## Package Leaflet: Information for the User

### Triprolidine 2.5mg/pseudoephedrine 60mg Tablets



#### What is in this leaflet

1. What Triprolidine/pseudoephedrine is and what it is used for
2. What you need to know before you take Triprolidine/pseudoephedrine
3. How to take Triprolidine/pseudoephedrine
4. Possible side effects
5. How to store Triprolidine/pseudoephedrine

#### **1. What Triprolidine/pseudoephedrine is and what it is used for**

Triprolidine/pseudoephedrine Tablets is a medicine which is used to relieve the symptoms of colds, flu and allergies including sneezing, runny nose, watery eyes, nasal congestion and blocked sinuses.

The tablets contain pseudoephedrine hydrochloride, which is a decongestant that relieves nasal and sinus congestion and triprolidine hydrochloride which is an antihistamine that helps stop sneezing, runny nose and watery eyes.

This medicine is for use in adults and children aged over 12 years.

#### **2. What you need to know before you take Triprolidine/pseudoephedrine**

Do not take this medicine:

- If you have ever had a bad reaction to any of the ingredients.
- If you have high blood pressure or heart disease.
- If you have diabetes



### Warnings and precautions

Tell your doctor about all of your health conditions, including:

- If you have kidney or liver problems.
- If you have alcohol dependence.
- If you have bronchitis, emphysema or asthma.
- If you are susceptible to glaucoma.
- If you have blocked arteries or veins.
- If you are being treated for a thyroid disorder
- If you have prostate problems



### Other medicines and Triprolidine/pseudoephedrine

Do not take this medicine if you are taking any other medicines, including drugs used to treat:

- Sleep disorders
- pain
- mood disorders
- anxiety and tension
- cramps or spasms
- high blood pressure
- heart rhythms or contractions
- migraine
- contractions during childbirth



### Pregnancy and breastfeeding

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.



### 3. How to take Triprolidine/pseudoephedrine

**Children under 12 years:** This medicine is not recommended for children under 12 years old.

**Adults and children aged 12 years and over:** One tablet every 4 - 6 hours, up to 4 times a day. Leave at least 4 hours between doses. Do not give more than 4 doses in 24 hours.



### 4. Possible side effects

Like all medicines Triprolidine/pseudoephedrine Tablets can have side-effects, although not everybody gets them. If you experience any of the following, stop taking this medicine and seek immediate medical help: Severe Allergic reactions, hallucinations, paranoid delusions or seizures and sudden onset of fever.

Other side effects include:

- Headache
- Difficulty sleeping, nervousness, dizziness
- Difficulty performing tasks
- Drowsiness
- Blurred Vision
- Thickened mucus, dry mouth or nausea
- Confusion or depression
- Tremors, shakiness or slurred speech
- Low blood pressure
- Heart attack
- Tingling or numbness of hands or feet
- High blood pressure
- Nose bleeds, dry nose or dry throat
- Stomach pain or vomiting
- Pain when passing water
- Reduced blood flow to the optic nerve



## 5. How to store Triprolidine/pseudoephedrine

- Store below 25°C.
- Store in the original package to protect from light and moisture.
- Keep this medicine out of the sight and reach of children.
- Do not use this medicine after the end of the month shown as an expiry date on the packaging.
- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

### Contact with Saudi Food Drugs Authority

Call Center 19999

Phone 0118806000-0112038222

Free Phone 8002490000

Email: [webmaster@sfda.gov.sa](mailto:webmaster@sfda.gov.sa)

Postal address

Saudi Food & Drugs Authority

(3292) North Road – Al Nafal

Unit (1)

Riyadh 13312 – 6288

Saudi Arabia

## النشرة الدوائية: معلومات للمستخدم

تريبروليدين 2.5 مجم / سودوايفيدرين 60 مجم أقراص

ما هو في هذه النشرة



1. ما هو تريبروليدين / السودوايفيدرين وما هي دواعي استخدامه
2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول تريبروليدين / السودوايفيدرين
3. كيف تأخذ تريبروليدين / السودوايفيدرين
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين تريبروليدين / السودوايفيدرين

**1. ما هو تريبروليدين / السودوايفيدرين وما هي دواعي استخدامه**  
تريبروليدين / السودوايفيدرين هو دواء يستخدم للتخفيف من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والحساسية بما في ذلك العطس وسيلان الأنف والعينين الدامعة واحتقان الأنف وانسداد الجيوب الأنفية.  
تحتوي الأقراص على السودوايفيدرين ، وهو مزيج احتقان يخفف من احتقان الأنف والجيوب الأنفية ، و تريبروليدين وهو مضاد للهيستامين يساعد على وقف العطس وسيلان الأنف ودموع العين.  
هذا الدواء للاستخدام للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.

**2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول تريبروليدين / السودوايفيدرين**  
لا تتناول هذا الدواء:  
• إذا كان لديك في أي وقت رد فعل سيئ تجاه أي من المكونات.  
• إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.  
• إذا كنت تعاني من مرض السكري

### المحاذير والإحتياطات



- أخبر طبيبك عن جميع حالاتك الصحية ، بما في ذلك:
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو الكبد.
  - إذا كنت تعاني من إدمان الكحول.
  - إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
  - إذا كنت عرضة للإصابة بالجلوكوما.
  - إذا كان لديك انسداد في الشرايين أو الأوردة.
  - إذا كنت تعالج من اضطراب الغدة الدرقية
  - إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا

### الأدوية الأخرى و تريبروليدين / السودوايفيدرين



لا تتناول هذا الدواء إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية المستخدمة لعلاج:

- اضطرابات النوم
- ألم
- اضطرابات المزاج
- القلق والتوتر
- تقلصات أو تقلصات
- ضغط دم مرتفع
- ضربات القلب أو الانقباضات
- صداع نصفي
- تقلصات أثناء الولادة

### الحمل والرضاعة



إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، تعتقد أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل ، اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.

### 3. كيف تأخذ تريبروليدين / السودوايفيدرين



الأطفال أقل من 12 عامًا: لا ينصح بهذا الدواء للأطفال دون سن 12 عامًا.  
البالغون والأطفال بعمر 12 سنة وما فوق: قرص واحد كل 4 - 6 ساعات ، حتى 4 مرات في اليوم. اترك ما لا يقل عن 4 ساعات بين الجرعات. لا تعط أكثر من 4 جرعات خلال 24 ساعة.

### 4. الآثار الجانبية المحتملة



مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يكون لأقراص تريبروليدين/pseudoephedrine آثار جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها للجميع. إذا واجهت أيًا مما يلي ، فتوقف عن تناول هذا الدواء واطلب المساعدة الطبية على الفور: ردود فعل تحسسية شديدة ، وهلوسة ، وأوهام أو نوبات بجنون العظمة ، وظهور مفاجئ للحمى.  
تشمل الآثار الجانبية الأخرى:

- صداع الرأس
- صعوبة النوم والعصبية والدوخة
- صعوبة أداء المهام

- النعاس
- عدم وضوح الرؤية
- مخاط كثيف وجفاف الفم أو غثيان
- الارتباك أو الاكتئاب
- رعشة أو رعشة أو تعثر في الكلام
- ضغط دم منخفض
- نوبة قلبية
- وخز أو خدر في اليدين أو القدمين
- ضغط دم مرتفع
- نزيف الأنف أو جفاف الأنف أو جفاف الحلق
- ألم في المعدة أو قيء
- ألم عند التبول في الماء
- انخفاض تدفق الدم إلى العصب البصري

#### 5. كيفية تخزين تريبوليدين / السودوإيفيدرين



- يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.
- يجب التخزين في العبوة الأصلية لحمايته من الضوء والرطوبة.
- احفظ هذا الدواء بعيداً عن رؤية ومتناول أيدي الأطفال.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد نهاية الشهر الموضح كتاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة.
- لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة.

#### للاتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء

الرقم الموحد 19999  
هاتف رقم 0112038222 - 018806000  
الهاتف المجاني 8002490000  
البريد الإلكتروني: [webmaster@sFDA.gov.sa](mailto:webmaster@sFDA.gov.sa)

العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء  
(3292) الطريق الدائري الشمالي - حي النفال  
الوحدة رقم 1  
الرياض 13312 - 6288  
المملكة العربية السعودية